ΦΨΩ

LA REGULARIZATION EN PSYCHANALYSE

Gérôme Taillandier

Lorsqu'on cherche à définir l'intégrale de Feynman de l'interaction, par exemple, d'un électron et d'un proton, apparaissent des quantités infinies qui empêchent un résultat viable.

En ajoutant à l'intégrale la masse très élevée d'un photon fictif, on obtient la régularization de Pauli-Villars, et l'intégrale devient finie.

Cette méthode est liée à une rotation de Wick de l'affaire.

Lorsque Freud se trouve, après Breuer, confronté à la nécessité de rendre compte de l'écart entre ce qui est éprouvé physiologiquement de la névrose par l'observateur, et la conscience que celui-ci peut

en obtenir, on s'aperçoit, avec Anna O., que cette corrélation est inexistante, de sorte que Freud est obligé d'introduire une quantité de masse élevée pour obtenir un résultat fini à cette corrélation. Cette masse fictive est l'ICS, ou Ubw.

De sorte que Freud est amené à introduire un fondement de l'appareil psychique constitué de TROIS termes, la physiologie, l'Ubw. et la perception-conscience. De sorte que le lien est établi entre ces deux termes par la particule de masse élevée, l'inconscient. C'est la méthode de Pauli-Villars.